**Modelli numerici meteorologici
e
previsioni del tempo**

Un po' di storia ...

Spinta iniziale: esigenze belliche, prevenire catastrofi naturali che distruggessero le flotte. Viaggi di esplorazione

- La previsione meteorologica numerica è una disciplina recente che si è sviluppata nel corso della seconda metà del 1900, beneficiando del costante progresso nel campo del calcolo
- La storia della previsione numerica è stata contrassegnata da alcune tappe fondamentali, decisive per l'evoluzione di questa disciplina, che sono brevemente ricordate nel seguito.

Vilhelm Bjerknes, fisico e meteorologo norvegese, nel 1904 intuì che, una volta determinato lo stato iniziale dell'atmosfera, sarebbe stato possibile prevederne il comportamento futuro utilizzando le leggi della fluidodinamica e della termodinamica (*"Weather forecasting as a problem in mechanics and physics"* in *Meteorologische Zeitschrift*).

Riconosce quindi che la previsione del tempo è un problema deterministico ai valori iniziali che richiede:

- la conoscenza con sufficiente precisione dello stato dell'atmosfera ad un certo istante;
- la conoscenza con sufficiente precisione delle leggi che governano l'evoluzione temporale degli stati dell'atmosfera.

1916-22: il primo tentativo di previsione numerica

Lewis Fry Richardson fu il primo a tentare di applicare i metodi del calcolo numerico per risolvere le equazioni della previsione del tempo, occupandosi di un caso di studio su una porzione limitata d'Europa, in cui era stata organizzata una fitta (per l'epoca) rete di osservazioni (approccio matematico alla previsione meteo).

L'esperimentò fallì, perché in assenza di calcolatori elettronici non era possibile risolvere in tempo utile l'enorme quantità di calcoli richiesta per la previsione (problema che verrà risolto 30 anni più tardi) e perché i metodi numerici nascondevano un errore che generava instabilità numerica. La previsione a 6 ore che venne prodotta si rivelò clamorosamente sbagliata e irrealistica.

I matematici **Courant, Friedrichs e Lewy** studiarono nel 1928 in modo sistematico la maniera di approssimare le equazioni differenziali con i metodi alle differenze finite, determinando i criteri che devono essere soddisfatti per ottenere soluzioni stabili delle equazioni.

Ciò portò alla formulazione noto criterio CFL per la stabilità delle soluzioni numeriche

Jule Gregory Charney assieme a **Ragnar Fjörtoft** e **John von Neumann** nel 1950 realizzò con successo la prima previsione del tempo (altezza geopotenziale a 500 hPa), effettuando i calcoli sul calcolatore a valvole ENIAC (Electronical Numerical Integrator and Computer), di proprietà dell'esercito e installato ad Aberdeen (Maryland, USA), lo stesso che venne impiegato per lo sviluppo del progetto Manhattan sulla bomba atomica.

Fu utilizzato un modello barotropico (1 livello), integrando l'equazione della vorticità quasi geostrofica (al posto delle equazioni complete del moto), definita da Charney due anni prima (anche grazie ai lavori precedenti di Rossby e altri)

Questa equazione ha il vantaggio di essere più semplice e di non contenere, tra le possibili soluzioni, le onde sonore e quelle di gravità. Essa rappresenta una discreta approssimazione per i moti atmosferici a scala sinottica nella media troposfera.

Da allora lo sviluppo nelle previsioni è andato di pari passo con lo sviluppo dell'informatica.

1956

Carl Gustav Arvid Rossby, scienziato svedese negli anni '40 negli USA elaborò le teorie sulle onde lunghe atmosferiche, per le quali in primo luogo è ricordato, dette «Onde di Rossby». Il suo ruolo fu determinante anche nello sviluppo delle equazioni per la previsione numerica del tempo, e la sua influenza fu importante nella formazione scientifica di Charney.

Edward Norton Lorenz il cui nome è indissolubilmente legato all'elaborazione della teoria del caos.

DAL 1950 ad oggi...

- Gli avanzamenti hanno beneficiato in misura comparabile dei progressi *tecnici* nel settore del calcolo e di quelli *scientifici* del settore della Meteorologia dinamica e numerica.
- il rapporto tra il numero di operazioni effettuato negli attuali modelli globali e quello dei primi modelli è di circa 10^9 .
- La potenza di calcolo è cresciuta dal 1950 di un fattore di circa $10^{10} - 10^{11}$.
- Altrettanto importante è il miglioramento delle osservazioni su scala globale, soprattutto a partire dalla **rete di radiosondaggi** ad iniziare dagli anni '40.
- Di recente sono divenute determinanti le osservazioni da **satelliti**, ma anche da aerei, da boe etc.
- Si è passati dai modelli *barotropici* ai modelli *baroclini* multi-livelli (operativi dal 1955), che permettono di descrivere il principale meccanismo alla base dell'insorgenza delle perturbazioni atmosferiche, ossia l'instabilità baroclinica.
- Negli anni sessanta **Hinkelman** in Germania e **Phillips** negli USA introducono le *equazioni primitive* (molto simili a quelle utilizzate da Richardson), più accurate per descrivere i moti atmosferici di scale inferiori ai 1000 km, anche se più costose in termini di tempo di calcolo.
- I modelli diventano globali e si introducono nuove tecniche di soluzione delle equazioni.

Cosa sono i modelli numerici:

-rappresentazione schematica e semplificata della realtà, descritta attraverso un insieme di equazioni che simulano il comportamento della natura

-sophisticated simulators of physical processes and atmospheric motions
-numerical calculation instruments

Equazioni (differenziali alle derivate parziali):

eq. del moto (di Navier-Stokes)

eq. termodinamica

eq. di evoluzione del vapore acqueo

eq. di continuità

eq. di stato dei gas (non è prognostica!)

variabili prognostiche: $\phi, u, v, q, T (\theta), p_s$

variabili diagnostiche: nubi, pioggia ...

- approssimazione idrostatica: $\partial p / \partial z = -\rho g$

Discretizzazione: punti di griglia

Una soluzione analitica semplice delle equazioni, valida in continuo per tutti i punti della superficie terrestre, non esiste.

Diversi gradi di approssimazione a seconda dello scopo

modelli quasi (semi) geostrofico
studio di interazione fronti-orografia
studio della ciclogenesi orografica

modelli alle eq. primitive in versione canale
prototipo per lo studio dello sviluppo di un
ciclone extratropicale

modelli meteorologici

Modello quasi geostrofico

-sviluppo in serie nel numero di Rossby

$Ro=U/fL$ (acceleraz/Coriolis) $\ll 1$ - moti a larga scala

Eq. di vorticità quasi geostrofica (sistema filtrato: no onde di gravità, sonore). Descrive moti a larga scala alle media-alte latitudini (onde di Rossby, onde barocline, ciclogenesi). Applicazione: ciclogenesi orografica.

Modello alle equazioni primitive – versione canale

M.S.L. PRESSURE

INITIAL DATE 01/04/2002 0000 UTC
 FORECAST HOUR + 60 VALID AT 03/04/2002 12 UTC
 INTERVAL 2.00

BOLAM MODEL, ISAC-CNR, BOLOGNA

60 h

THETA E AT 850 HPA

INITIAL DATE 01/04/2002 0000 UTC
 FORECAST HOUR + 60 VALID AT 03/04/2002 12 UTC
 INTERVAL 3.00

BOLAM MODEL, ISAC-CNR, BOLOGNA

ACC. TOT. PREC. (MM) IN 3 H

INITIAL DATE 01/04/2002 0000 UTC
 FORECAST HOUR + 60 VALID AT 03/04/2002 12 UTC
 INTERVAL 2.00

BOLAM MODEL, ISAC-CNR, BOLOGNA

Dry case

Moist case (rh = 98%)

Miglietta & Buzzi, QJRMS 2004
(BOLAM model)

Modello numerico meteorologico

NWP: Numerical Weather Prediction

- Scopo: previsione meteorologica
- Simulano l'evoluzione dei parametri fisici caratterizzanti l'atmosfera
- Risolvono le equazioni della fisica dell'atmosfera attraverso metodi numerici
- Partono da una condizione iniziale, eseguono l'integrazione e forniscono un output che generalmente viene mostrato in forma grafica ("standard")

I modelli meteorologici per poter fare previsioni devono considerare tutti i processi fisici dell'atmosfera (piccoli modelli all'interno del modello):

- scambi turbolenti
- effetti del suolo
- processi legati al ciclo dell'acqua e microfisica
- scambi radiativi

PARAMETRIZZAZIONE: rappresentazione con relazioni semplificate degli effetti di questi processi che avvengono a scale più piccole del passo di griglia e che quindi non possono essere descritti esplicitamente. Si definiscono relazioni aggiuntive tra le variabili esplicite.

"Fisica" e parametrizzazioni nei modelli

Calcolo dei **flussi radiativi** in atmosfera, tendo conto delle nubi, e alla superficie

Calcolo del bilancio idrico e termico dei primi strati di **suolo vegetato** (fino a qualche metro di profondità) e calcolo degli scambi di calore e vapore tra atmosfera e **oceano**

"Fisica" e parametrizzazioni nei modelli

Parametrizzazione della "microfisica" e del ciclo dell'acqua associati alla precipitazione stratiforme

Parametrizzazione della convezione atmosferica - solo nei modelli idrostatici o che non hanno risoluzione sufficientemente elevata (corrispondente a un passo di griglia $< \sim 4$ km)

2 CATEGORIE DI MODELLI:

Global Model

globali, spettrali, risoluzione 25÷100 km (es. di Milano a 2000m), richiede solo la condizione iniziale

Limited Area Model (LAM)

punti di griglia, alta risoluzione 5 ÷20 km, previsioni fino a 72 h

migliore descrizione dell'orografia locale, dei fenomeni (micro)fisici, applicazione ad eventi alluvionali

nesting → condizioni iniziale e al contorno

Modelli non-idrostatici

time step breve per onde sonore sulla verticale, più dettagliata descrizione dei fenomeni, ris 1 ÷2 km; convezione risolta esplicitamente

**Impatto
della
risoluzione
orizzontale**

Orografia dei modelli e risoluzione orizzontale

— Vera

— Modello

● Punti di griglia

Bassa Risoluzione

Aumento nel tempo della risoluzione orizzontale dei modelli meteorologici

Modello ECMWF:
attuale ~ 17 km.

Modello MOLOCH (ISAC): 2.3 km

GLOBAL MODELS

Global model (1)

ECMWF:
European
Centre for
Medium-range
Weather
Forecasts

Reading (UK)

ECMWF

Tuesday 17 February 2009 00UTC ©ECMWF Forecast t+188 VT: Tuesday 24 February 2009 00UTC
500 h Pa Height

Global model (2)

Tuesday 17 February 2009 00UTC ©ECMWF Forecast t+168 VT: Tuesday 24 February 2009 00UTC
500 hPa Height

Global model (3)

GFS: Global Forecasting System

NCEP: National Centers for Environmental Prediction

USA

Global model (4)

GPH at 500 hPa (dam)

Initial time Thu, 18/02/2010 00:00 UTC

Forecast + 0 h (000 d 00 h) valid Thu, 18/02/2010 00:00 UTC

Contour interval 6.

GLGBO MODEL, ISAC-CNR, BOLOGNA, ITALY

LAM (1) → Nesting

LAM - esempio

ECMWF
analysis

6-hourly boundary condition: ECMWF Forecast (from 12 UTC)

GARD EVENT: 8-9 September 2002

MODEL OROGRAPHY

INITIAL DATE 08/09/2002 0000 UTC
FORECAST HOUR +12 VALID AT 08/09/2002 12 UTC
INTERVAL 250.

**BOLAM
Son**

BOLAM MODEL, ISAC-CNR, BO

MODEL OROGRAPHY

INITIAL DATE 08/09/2002 0000 UTC
FORECAST HOUR +24 VALID AT 09/09/2002 00 UTC
INTERVAL 250.

MOLOCH

BOLAM MODEL, ISAC-CNR, BOLOGNA

OROGRAPHY

INITIAL DATE 08/09/2002 0000 UTC
FORECAST HOUR +12 VALID AT 08/09/2002 12 UTC
INTERVAL 250.

**BOLAM
Father**

MOLOCH, ISAC-CNR, BOLOGNA

START

MAP: Mesoscale Alpine Programme 1999

RT0T-RT0T2
R990920_06 1999/09/20 Mon06(+18)

ECMWF

risoluzione ~ 60 km, globale idrostatico

MAP: Mesoscale Alpine Programme 1999

**ALADIN,
12 km, LAM idrostatico**

MAP: Mesoscale Alpine Programme 1999

DIFI (Genoa - Italy) - ISAO-CNR (Bologna - Italy)
Total precipitation cumulated on previous 12h [mm (12h)^{-1}]
06Z Mon 20 SEP $\tau = 18\text{h}$

Model: **BOLAM99_006x006**
Time 0: 12Z19SEP1999 Resolution: 0.0844°x0.0600°

BOLAM,
6.5 km, LAM idrostatico

MAP: Mesoscale Alpine Programme 1999

RTOT_ (mm)

MC2_1999091921_09 1999/09/20 Mon06(+09)

**MC2,
3 km, LAM non-idrostatico**

MAP D-PHASE 2007

Demonstration of Probabilistic Hydrological and Atmospheric Simulation of flood Events in the Alpine region

The D-PHASE Operations Period (DOP) has been from 1 June to 30 November 2007.

End-to-end flood forecasting system 39

TABLE 1. Atmospheric models participating in D-PHASE (real time only; limited-area ensemble prediction systems, and high-resolution deterministic models) with model specifications (computational domain).

Model name on data archive	Model*	Ensemble size (1 = deterministic)	Mesh size [km (degrees)]	Forecast range (h)	Institution and contact person(s)
CLEPS	COSMO-LEPS	16	10 (0.09)	132	ARPA Emilia-Romagna, Andrea Montani
MOGREPS	MOGREPS	24	25 (0.22)	54	Met Office, Kelyvn Robertson
INMSREPS	SREPS	20	(0.25)	72	AEMET, Daniel Santos
CSREPS	COSMO-SREPS	16	10 (0.09)	72	ARPA Emilia-Romagna, Chiara Marsigli
LAMEPSAT	ALADIN-LAEF	17	(0.15)	60	ZAMG, Sabine Leroch
PEPS	PEPS	variable	(0.0625)	42	EUMETNET SRNVP, Michael Denhard
MPEPS	Micro-PEPS	variable	(0.02)	18	DWD, Michael Denhard
COSMOCH7	COSMO-7	1	7 (0.0625)	72	MeteoSwiss, Felix Ament
COSMOCH2	COSMO-2	1	2.2 (0.02)	24	
LMEURO	COSMO-ME	1	7 (0.0625)	72	CNMCA, Lucio Torrissi
LMITA	COSMO-IT	1	2.8 (0.025)	30	
LAMI17	COSMO-I7	1	7 (0.0625)	72	ARPA Emilia-Romagna, Davide Cesari
LAMI28	COSMO-I2	1	2.8 (0.025)	48	
LME	COSMO-EU	1	7 (0.0625)	78	DWD, Michael Denhard
LMK	COSMO-DE	1	2.8 (0.025)	21	
ISACMOL	MOLOCH	1 (BC from GFS)	2.2 (0.02)	39	ISAC-CNR, Silvio Davolio
ISACMOL2	MOLOCH	1 (BC from IFS)	2.2 (0.02)	48	ISAC-CNR, Silvio Davolio
ARPALMOL	MOLOCH	1	2.2 (0.02)	36	ARPA Liguria, Matteo Corazza
QBOLAM33	QBOLAM	1	33 (0.3)	60	APAT, Stefano Mariani
QBOLAM11	QBOLAM	1	11 (0.1)	48	
ALADFR	ALADIN	1	(0.1)	30	Météo-France, Eric Bazile (ALADFR), Yann Seity (AROME)
AROME	AROME	1	(0.04)	30	
MM5_2_CT	MM5	1	(0.02)	24	University of Hohenheim, Hans-Stefan Bauer, Matthias Grzeschik
MM5_2_4D	MM5	1	(0.02)	24	
MM5_60	MM5	1	(0.56)	72	FZK IMK-IFU, Johannes Werhahn, Andreas Marx
MM5_15	MM5	1	(0.14)	72	
MM5_375	MM5	1	(0.04)	60	
ALADAT	ALADIN	1	9.6 (0.07 × 0.11)	48	ZAMG, Yong Wang
CMCGEML	GEM-LAM	1	15 (0.135, 0.188)	24	Environment Canada, Ron McTaggart-Cowan
CMCGEMH	GEM-LAM	1	2.5 (0.0225, 0.0327)	18	

TABLE 2. Hydrological models participating in D-PHASE (real-time only). A hydrological model running in ensemble mode is denoted as e-hm; a hydrological model running deterministically is denoted as d-hm.

Model name on data archive	Applications (No. of catchments)	Driving model	Institution and contact person(s)
PREVAH (e-hm, d-hm)	6 in Switzerland 2 in Italy	CLEPS, COSMOCH2, COSMOCH7, MM5_15	ETHZ/WSL, Simon Jaun, Massimiliano Zappa
HBV (e-hm, d-hm)	12 in Switzerland	CLEPS, PEPS, COSMOCH2, COSMOCH7, (IFS)	BAFU, Stephan Vogt
LAMBRO (e-hm, d-hm)	2 in Italy	CLEPS, LAMI28, ISACMOL	ARPA Lombardia, Matteo Cislighi
DIMOSOP (e-hm, d-hm)	10 in Italy	CLEPS, ISACMOL, ISACMOL2	University of Brescia, Roberto Ranzi
FEST (e-hm)	2 in Switzerland 1 in Italy	CLEPS	POLIMI, Giovanni Ravazzani
LARSIMBY (d-hm)	10 in Germany	LME, GFS, GME	WWA Kempten, Uwe Ehret
LARSIMBW (d-hm)	2 in Germany	LMK, LME	LUBW, Werner Schulz

ISACMOL valid: 2007-09-26_12:00 init: 2007-09-25_09:00 +27:00hrs
colors: 12hr accumulated total precipitation [kg/m²], contour: terrain elevation [m]

MAP D-PHASE Copyright

ISACMOL valid: 2007-09-26_10:00 init: 2007-09-25_09:00 +25:00hrs
colors: High-level cloud cover [%], contour: terrain elevation [m]

MAP D-PHASE Copyright

contact: SIMO Davila <s.davila@boos.unl.it>

QUALITÀ DELLA PREVISIONE DETERMINISTICA

- range di previsione**
 - variabile considerata**
 - varia a seconda della situazione**
-
- scores per quantificare la performance dei modelli**

previsione "buona" fino a 9 giorni

previsione "buona" fino a 5 giorni

Emisfero nord

Emisfero sud

Tropici

Europa
dal 1975
al 1999

Climatologia

1975

1983

1990

1999

Météo
France

Le previsioni a 3 giorni del 1999 hanno la stessa affidabilità delle previsioni a 24 ore del 1983

Origine degli errori nella previsione

- **Le osservazioni sono imperfette**
- **I modelli numerici sono imperfetti**
 - approssimata rappresentazione della realtà
 - approssimazioni dei metodi numerici
- **Le condizioni iniziali sono imperfette**
- **previsione → problema alle condizioni iniziali**
- **atmosfera → sistema dinamico caotico**
- **Gli errori crescono in ampiezza**
- **La scala spaziale degli errori cresce**

OSSERVAZIONI: tante ma imperfette

12 x 10⁶ osservazioni
assimilate ogni 12 ore

ECMWF Data Coverage (All obs DA) - SYNOP/SHIP
17/FEB/2009; 00 UTC
Total number of obs = 29427

ECMWF Data Coverage (All obs DA) - TEMP
17/FEB/2009; 00 UTC
Total number of obs = 635

stazioni al suolo

radiosondaggi

ECMWF Data Coverage (All obs DA) - AIRCRAFT
17/FEB/2009; 00 UTC
Total number of obs = 38399

ECMWF

ECMWF Data Coverage (All obs DA) - ATOVS
17/FEB/2009; 00 UTC
Total number of obs = 454590

ECMWF

aerei di linea

satellite polare

Errore dei modelli: diversa risoluzione orizzontale

Another glimpse at model error

sensitivity of forecast to horizontal resolution

init. time 15 Dec 2010, 0 UTC, $t = +48$ h

— T1279

— T639

Errore dei modelli: diversa risoluzione orizzontale

Another glimpse at model error

sensitivity of forecast to horizontal resolution

init. time 15 Dec 2010, 0 UTC, $t = +120$ h

— T1279

— T639

Errore dei modelli: diversa risoluzione orizzontale

Another glimpse at model error

sensitivity of forecast to horizontal resolution

init. time 15 Dec 2010, 0 UTC, $t = +240$ h

— T1279

— T639

ASSIMILAZIONE DATI

- Definizione di un'accurata condizione iniziale
- Analisi=migliore approssimazione possibile della realtà, definita sul grigliato del modello
- Unisce due “pezzi” di informazione: osservazioni + first guess

osservazioni: forniscono la misura puntuale, sono discontinue nello spazio e nel tempo, ci sono aree quasi scoperte, sono un campo eterogeneo e irregolarmente distribuito.

first guess: previsione a breve termine del modello: fornisce un campo continuo e fisicamente coerente in grado di colmare le lacune osservative, trasportando le informazioni dei dati osservati anche dove non ci sono, imponendo rigide costrizioni fisiche.

metodi matematici estremamente complessi, uniscono queste due parti di informazione in modo ottimale e forniscono l'analisi definita su punti di griglia del modello

Atmosfera e caos: limiti di predicibilità

Dalla previsione deterministica alla previsione probabilistica

Edward Lorenz (MIT)

- Negli anni '50 con un modello di sistema dinamico molto semplice (3 eq., 3 inc.) soggetto a forzatura e dissipazione scopre il comportamento caotico
- Lorenz (1963): l'impredicibilità dipende dalla (infinita) *sensibilità alle condizioni iniziali*: due stati iniziali, per quanto vicini tra loro, possono condurre in breve a stati molto diversi.
- Lorenz (1972): '*paradosso della farfalla*': comunicazione dal titolo "*Predicibilità: possono i battiti delle ali di una farfalla in Brasile scatenare un tornado nel Texas?*".
- Crescita degli errori nella condizione iniziale (raddoppio ogni 2 giorni sulla scala sinottica, meno di 2 ore sulla scala convettiva) e limite di predicibilità dell'atmosfera (circa 15 giorni per la predicibilità deterministica globale - *predicibilità del primo tipo*).
- Lorenz (2006) - **caos deterministico: quando il presente determina il futuro ma il presente approssimato non determina il futuro nemmeno approssimativamente.**
- Caos deterministico: tipi di tempo mai uguali, ma possono essere simili; sono compresi in un sottoinsieme limitato rispetto a tutti gli stati possibili (ORBITE nello spazio delle fasi il cui insieme è detto ATTRATTORE)

We introduce an infinitesimal perturbation
in the initial conditions and soon the
forecast loses all skill

Impossibilità di fare previsioni deterministiche esatte oltre un certo t

introduzione criteri statistici/probabilistici che tengono conto della sensibilità alle c.i.

ENSEMBLE FORECASTING

diverse previsioni che partono da diverse condizioni iniziali tutte compatibili con l'incertezza associata all'analisi

Una volta ottenuta l'analisi possono comunque esistere altre condizioni iniziali, differenti di poco, ma egualmente plausibili entro il margine di incertezza con cui è definita l'analisi stessa (associato all'analisi vi è sempre un errore). Di conseguenza si può fare una previsione deterministica che parte dall'analisi ottenuta e che potenzialmente dovrebbe essere la migliore previsione. Ma siccome ci possono essere altri stati iniziali, allora si potranno anche avere altre previsioni ugualmente attendibili.

Una volta ottenuta l'analisi possono comunque esistere altre condizioni iniziali, differenti di poco, ma egualmente plausibili entro il margine di incertezza con cui è definita l'analisi stessa (associato all'analisi vi è sempre un errore).

Di conseguenza si può fare una previsione deterministica che parte dall'analisi ottenuta e che potenzialmente dovrebbe essere la migliore previsione. Ma siccome ci possono essere altri stati iniziali, allora si potranno anche avere altre previsioni ugualmente attendibili.

Il fatto di considerare più stati iniziali simili, ma diversi, permette di tenere conto dell'incertezza da cui parte la previsione, cioè l'approssimazione con cui conosciamo lo stato attuale dell'atmosfera.

rosa di previsioni (generalmente a risoluzione inferiore)

cluster

previsione

A major tool to “fight chaos” is ensemble forecasting

An ensemble forecast starts from initial perturbations to the analysis...
In a good ensemble “truth” looks like a member of the ensemble
The initial perturbations should reflect the analysis “errors of the day”

Prodotti dell'ensemble forecast

- 1) ensemble mean: più accurata di qualsiasi singola previsione (effetto filtro sugli errori)

Growth of RMS error of single forecast and ensemble mean

previsione deterministica

media dell'ensemble

Growth of RMS error of single forecast and ensemble mean

2) single previsioni – scenari possibili

Figure 2. The full ensemble of forecasts for day 3 for the case shown in Figure 1.

3) dispersion dell'ensemble - spaghetti plot – affidabilità della previsione

Verona

Thu, 31 JAN 2002 00Z

850 hPa Temperatur in Grad C

Daten: 00z-Ensembles des MRF von NCEP

Wetterzentrale

Probabilità di avere precipitazioni superiori a 10 mm/24 h

Tuesday 17 February 2009 12UTC ©EC MWF Forecast probability t+000-024 VT: Tuesday 17 February 2009 12UTC - Wednesday 18 February 2009 12UTC
Surface: Total precipitation of at least 10 mm

EPS Meteogram
Rome (14m) 42.02°N 12.38°E
Deterministic Forecast and EPS Distribution Tuesday 17 February 2009 12 UTC

Total Cloud Cover (okta)

Total Precipitation (mm/6h)

10m Wind Speed (m/s)

2m Temperature reduced to station height (°C) 111 m (T799) 195m (T399)

copertura nuvolosa

precipitazione

vento a 10 m

temperatura a 2 m

Previsione probabilistica della traiettoria degli uragani

20060627 12 UTC

Probability that JELAWAT will pass within 120km radius during the next 120 hours
tracks: black=OPER, green=CTRL, blue=EPS numbers: observed positions at t+.h

Come generare la condizione iniziale?

1. perturbazioni casuali (numero di integrazioni, esplora tutto lo spazio delle orbite possibili?, componenti casuali si annullano)
2. perturbazioni “ottimali” (individuare i modi più instabili del sistema)
 - Singular vectors (ECMWF)
 - Bred vectors (NCEP)

Multimodel ensemble:

supera il limite di modello perfetto, riduce errori casuali dei modelli ottimizzandone l'uso combinato, non si interessa delle condizioni iniziali

Multimodel-multianalysis ensemble

ENSEMBLE FORECASTING CON I LAM

La previsione di ensemble fatta con i modelli globali è soggetta alle limitazioni tipiche di un modello globale: la risoluzione limitata non permette di descrivere adeguatamente fenomeni a piccola scala, quali ad esempio precipitazioni convettive o interazioni con l'orografia. Ne consegue spesso una notevole sottostima della precipitazione in eventi intensi.

Si è così pensato di utilizzare un modello ad area limitata per generare le previsioni di ensemble, in modo da ovviare, almeno in parte, ai limiti dei modelli globali ed ottenere migliori previsioni specie del campo di precipitazione. In pratica si cerca di ottenere una regionalizzazione degli scenari dell'ensemble globale.

LEPS (Limited-area Ensemble Prediction System): si basa sull'inizializzazione del LAM attraverso condizioni ottenute dai membri dell'ensemble globale

Alluvione Firenze 1966

ECMWF reanalyses (ERA-40 and T511)

Adige River at Bronzolo [6926 km²]

Preliminary example of hydrological modelling using observed and model-output precipitation (including snow)

Cellina at Barcis

Sieve River at Fornacina

CESI METEO ita_x 3-Spettrale 26-09-2006 14:45 UTC copyright©2006 EUMETSAT

Previsione di un “Medicane”

Vento all'aeroporto di Galatina MAX 78 nodi = 150 km/h

RADAR

Pressione al suolo

CYCLONE TRAJECTORY - BOLAM

25.Sep.06, 12UTC - 26.Sep.06, 18UTC

<http://www.isac.cnr.it/dinamica/projects/forecasts>

Previsioni meteorologiche BOLAM - MOLOCH BOLAM - MOLOCH Weather Forecasts

ISAC-CNR, Bologna

BOLAM (11 km)

MOLOCH (2.3 km)

Moloch Archive (February 2009 to May 2010)

[Northern Italy](#)

[Southern Italy](#)

Presso l'Istituto [ISAC-CNR](#) è stata implementata una catena di previsione numerica in tempo reale, nell'ambito di una Intesa operativa tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e l'ISAC-CNR. Essa fornisce previsioni ad alta risoluzione fino a 72 ore sull'area Europea, fino a 48 ore sull'Italia.

La catena modellistica comprende il modello idrostatico [BOLAM](#) e il modello non idrostatico [MOLOCH](#), innestato in BOLAM. Entrambi i modelli sono stati sviluppati all'Istituto ISAC, sede di Bologna.

BOLAM opera con un passo di griglia di 0.10 gradi in coordinate ruotate (circa 11km), con 50 livelli e parametrizzazione (Kain-Fritsch) della convezione umida. MOLOCH ha un passo di griglia di 0.0207 gradi, corrispondente a 2.3 km, con 54 livelli. La convezione umida profonda è trattata esplicitamente.

Le condizioni iniziali e al contorno sono fornite dalle analisi (00 UTC) e previsioni del modello globale GFS del NCEP (USA).

Le integrazioni numeriche sono eseguite su un cluster di PC in ambiente Linux ([Debian GNU Linux](#)).

Le previsioni sono effettuate principalmente per scopi scientifici relativi alla sperimentazione della catena modellistica.

Geopotential height (dam) at 500 hPa

Initial time Wed, 01/02/2012 00:00 UTC

Forecast + 0 h (000 d 00 h) valid Wed, 01/02/2012 00:00 UTC

Bolam Model, CNR-ISAC, Italy

Geopotential height (dam) at 850 hPa

Initial time Wed, 01/02/2012 00:00 UTC

Forecast + 0 h (000 d 00 h) valid Wed, 01/02/2012 00:00 UTC

Bolam Model, CNR-ISAC, Italy

Cloud cover (%) Circles: low clouds - Stars: high clouds

Initial time Wed, 01/02/2012 03:00 UTC

Forecast + 0 h (000 d 00 h) valid Wed, 01/02/2012 03:00 UTC

Moloch Model, CNR-ISAC, Italy

Total precipitation (kg m⁻²) accumulated in 12 h at Ground or water surface

Initial time Wed, 01/02/2012 03:00 UTC

Forecast + 21 h (000 d 21 h) valid Thu, 02/02/2012 00:00 UTC

Moloch Model, CNR-ISAC, Italy

Wind at 10 m (m/s)

Initial time Wed, 01/02/2012 03:00 UTC

Forecast +03 h valid Wed, 01/02/2012 06:00 UTC

Moloch model, ISAC-CNR, Bologna, Italy